

De forskellige bøjletyper

Der findes overordnet 2 bøjletyper: fastsiddende og aftagelige

Eksempler på fastsiddende:

- Fast apparatur (FFA) også kaldet togskiner
- Quadhelix (QH) en form for fastsiddende ganebøjle
- HYRAX en anden type fastsiddende ganebøjle

Eksempler på aftagelige:

- Ganebøjle
- Aktivator eller voksebøjle
- Trainer eller voksebøjle
- Facemask
- Retainer eller holdebøjle

Behandlingen inddeles typisk i 2 faser: en aktiv og en passiv fase

I den aktive fase flyttes tænderne og kæberne påvirkes. Når behandlingsmålet er nået, overgår behandlingen til den passive fase, hvor tænderne fastholdes med holdebøjler/retainere.

Den aktive fases længde varierer meget fra få mdr. til flere år.

Den passive fase varierer ligeledes meget. I nogle situationer er det ikke nødvendigt med en passiv fase. Dog afsluttes de fleste behandlinger med en 2 årig kontrol af den passive fase. Den passive faser vil i princippet aldrig ophøre, hvis tænderne skal fastholdes i deres nye position. Tænderne bevæger sig hele livet, og eneste garanti mod at tænderne igen bliver skæve er at fortsætte med en retainer – gerne livslangt.